



## BOOSTRUM PASTE

Alimento complementar para animais

### Benefícios Gerais:

- ✓ Suplementação de Colostro
- ✓ Suporte Imunológico
- ✓ Auxilia no crescimento e desenvolvimento
- ✓ Prevenção de Problemas de Saúde



## BOOSTRUM PASTE

Alimento complementar para animais

- **Substituto ou complemento do colostro materno:** Essencial para os primeiros dias de vida dos ruminantes, quando o colostro natural não está disponível ou é insuficiente.
- **Rico em nutrientes:** Contém colostro em pó, que fornece imunoglobulinas e fatores bioativos para melhorar a imunidade dos neonatos.
- **Proteína bruta:** Promove o desenvolvimento muscular e a formação de tecidos nos primeiros dias de vida.
- **Administração oral simples:** Doses ajustadas para cada espécie e condição específica, facilitando a administração mesmo em situações de emergência.
- **Pronto para uso:** Dispensa preparações complexas e pode ser armazenado de forma prática.
- **Estabilização do equilíbrio nutricional:** Ajuda a evitar deficiências que podem surgir em ruminantes recém-nascidos, especialmente aqueles separados precocemente da mãe.
- **Conservação prática:** Pode ser armazenado por longos períodos quando mantido nas condições indicadas.

### ESPÉCIES ALVO

Vitelos, ovinos, caprinos

### ADITIVOS POR LITRO

Categoria de Aditivo | Identificador | Denominação Oficial | Conteúdo de Aditivos | Unidade

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Vitamina C          | 19 800,00 mg |
| Vitamina E          | 50,00 mg     |
| Ácido propiónico    | 1 365,72 mg  |
| Ácido acético       | 737,47 mg    |
| Propionato de sódio | 620,23 mg    |
| Sorbato de potássio | 20,04 mg     |

### Constituintes Analíticos (%)

|                |         |
|----------------|---------|
| Humidade       | 50,735% |
| Proteína bruta | 23,543% |
| Fibra bruta    | 0,030%  |
| Gordura bruta  | 1,265%  |
| Cinzas brutas  | 2,557%  |
| Sódio          | 0,135%  |

### MODO DE USO

#### Agitar antes de usar.

Administrar por via oral ao nascimento. A dose deve ser ajustada conforme o consumo diário da espécie.  
Na ausência de colostro materno, repetir após 6 horas.

**Vitelo:** 60mL por vitelo;  
**Borrego:** 20mL por borrego;  
**Cabrito:** 20mL por cabrito.

### RECOMENDAÇÃO

- O produto deve ser armazenado na embalagem original, hermeticamente fechado, protegido da luz, entre 5°C e 25°C.
- Consultar um especialista em alimentação ou um veterinário antes de usar o alimento ou prolongar a sua utilização.

### EMBALAGEM

100 ml